

## CASO RARO DE LIPOSSARCOMA DESDIFERENCIADO EM PERÍNEO

Marcelo Henrique Santos; Higino Felipe Figueiredo; Fumie Ishizawa; Marco Antonio Ricci Correa Júnior; Ênio Lúcio Duarte Coelho; Márcio Neves Stefani

**Introdução** – Os sarcomas de partes moles são tumores raros. O lipossarcoma é um dos tumores malignos de partes moles mais comuns na vida adulta. **Objetivo:** Descrever um caso raro de lipossarcoma em períneo. **Metodologia:** Análise do prontuário e revisão de literatura. **Relato de caso** – Paciente do sexo masculino, 52 anos, com queixa dor em região perineal com constipação intestinal e proctalgia acompanhada de massa em região perineal de rápido crescimento em torno de 6 meses. Iniciado incisão via perineal na rafe mediana, com ressecção da massa de aproximadamente 12x10 cm com margens de aproximadamente 2 cm. Anatomopatológico com imunohistoquímica concluiu como Lipossarcoma desdiferenciado, sendo indicado radioterapia adjuvante com boa tolerância pelo paciente. **Discussão** – Os lipossarcomas se originam de células mesenquimais primitivas. As duas localizações mais comuns são as extremidades, particularmente membros inferiores e o retroperíneo. É relativamente raro e o envolvimento do períneo ou espaço para retal. A ressecção cirúrgica do tumor primário continua a ser a principal forma de tratamento do sarcoma de partes moles. **Conclusão** – O tratamento cirúrgico com margens negativas do sarcoma de partes moles é fator determinante para o prognóstico, incluindo regiões de difícil abordagem como região perineal e espaço para retal.

Área de abrangência: cancerologia cirúrgica – partes moles