

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO POR NEOPLASIA ESTENOSANTE DE CÓLON: UM RELATO DE CASO

Caio Helcatã Pereira Costa; Leonardo Marinho; Stephanie Cella de Souza Franco; Ticiano Gonçalves Sampaio; Gabriela AyumiOwada Borges; Gerson Suguiyama Nakajima

Introdução: As neoplasias de cólon estão entre as principais causas de morte por neoplasia no mundo. Os pacientes acometidos por esta patologia podem apresentar diversos sinais e sintomas, dentre eles dor abdominal e obstrução intestinal. **Objetivo:** Relatar um caso de abdome agudo obstrutivo por neoplasia estenosante de cólon juntamente com a descrição dos achados tomográficos e procedimentos adotados na terapêutica cirúrgica oncológica. **Relato de caso:** E.G.C., sexo masculino, 76 anos de idade, deu entrada no serviço de pronto atendimento do Hospital 28 de Agosto na cidade de Manaus no dia 27/04 de 2015 com queixa de dor abdominal em flanco direito e parada de eliminação de fezes e flátulos há 3 dias, com ocorrência de 1 episódio de êmese. Foi realizada uma ultrassonografia de abdome total que evidenciou uma distensão no cólon ascendente e sugeriu a possibilidade de obstrução na flexura esplênica do cólon. Foi realizada uma Tomografia computadorizada de abdome e esta evidenciou uma “imagem em ponta de lápis” no quadrante superior esquerdo, sugerindo neoplasia estenosante de cólon. Por decisão do corpo clínico, este paciente foi transferido para o Hospital Universitário Getúlio Vargas e foi realizada uma laparotomia exploradora em que se verificou uma lesão estenosante na flexura esplênica do cólon, com posterior retirada da peça em bloco e estabelecimento de uma anastomose cólon-cólon. Durante o pós-operatório, o paciente evoluiu com infarto agudo do miocárdio e necessitou de assistência em unidade de terapia intensiva, porém veio a óbito no 9º dia de pós-operatório tendo como causa imediata choque cardiogênico. **Conclusão:** É importante valorizar a oncologia na rotina de assistência clínica-cirúrgica de emergência. Os pacientes com neoplasia de cólon podem evoluir oligossintomáticos ou apresentar uma rápida exacerbação dos sintomas obstrutivos. Por isso, a terapêutica cirúrgica é por vezes necessária em uma tentativa arriscada de se reestabelecer a homeostase nos pacientes que apresentam quadro de abdome agudo obstrutivo.

REFERÊNCIAS

Horton, Karen M., Ross A. Abrams, and Elliot K. Fishman. "Spiral CT of Colon Cancer: Imaging Features and Role in Management 1." *Radiographics* 20.2 (2000): 419-430.