

ESTUDO DAS COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA

Caio Helcatã Pereira Costa; Gabryella Dias Carvalho; Duany Araújo Sodré; Edson de Oliveira Andrade

Introdução: A cirurgia de exenteração pélvica é um procedimento que consiste na remoção dos órgãos pélvicos do aparelho reprodutor, digestório e urinário. É indicada principalmente para tratamento de neoplasias pélvicas localmente avançadas. Por se tratar de um procedimento complexo e extenso, o risco de complicações é elevado. Objetivos: Determinar a frequência e tipos de complicações respiratórias no pós-operatório imediato de pacientes submetidos à cirurgia de exenteração pélvica na Fundação Centro de Oncologia de Amazonas-FCECON. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo observacional, prospectivo e descritivo. As pacientes que voluntariamente aceitaram ser recrutadas para este estudo realizaram uma avaliação pré-operatória com espirometria, teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e avaliação da qualidade de vida funcional através da Escala de Karnofsky. Os dados relativos à ocorrência de complicações pós-operatórias foram levantados através das fichas de evolução nos respectivos prontuários. Resultados: Entre os de Março e Julho de 2015 foram rastreadas 5 pacientes que preenchessem aos critérios de inclusão na central de leitos da FCECON. Destas, uma paciente não pôde participar desta pesquisa devido à sua condição clínica de dor crônica. Duas pacientes aceitaram participar deste estudo, porém uma delas teve sua cirurgia cancelada devido a uma infecção fúngica. A outra paciente foi submetida à cirurgia e foi a óbito devido à ocorrência de uma fístula uretero-colônica, que causou choque séptico. Uma paciente se recusou a participar desta Pesquisa. Uma paciente não foi convidada a participar da pesquisa devido à indisponibilidade da equipe na semana anterior à cirurgia. Conclusão: Ao término deste estudo, reafirma-se a ideia de se indicar este tipo procedimento cirúrgico apenas como última alternativa terapêutica. O caso relatado teve um desfecho inesperado, tanto pelos cirurgiões quanto pelos pesquisadores. Isso sugere a necessidade em se prosseguir estudando este tema a fim de se produzir subsídios de otimização e aplicação deste recurso terapêutico.

REFERÊNCIAS

Lopes de Queiroz, F., et al. "Double-barrelled wet colostomy with simultaneous urinary and faecal diversion: results in 9 patients and review of the literature." *Colorectal Disease* 8.4 (2006): 353-359.