

## LEVANTAMENTO DOS CÂNCERES DE BOCA ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fabiana Pereira Glória; Cristina Melo Rocha; Lia Mizobe Ono; Jefferson Moreira de Medeiros; Maria Carolina Coutinho Xavier Soares; Thayana Braga Marques; Mariana Pereira Ferreira

**Introdução:** O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade bucal. Os dois principais fatores de risco relacionados ao câncer da boca são o tabagismo e o etilismo, existindo um efeito sinérgico entre esses fatores e uma relação diretamente proporcional com a quantidade e tempo de exposição. O carcinoma de células escamosas é o câncer de boca e de orofaringe mais frequente. A grande maioria dos cânceres de boca é diagnosticada tardiamente. **Objetivo:** Este projeto tem como objetivo Geral: Identificar os pacientes atendidos com cânceres de boca da Fundação CECON no período de 2009 - 2013. Específicos: Quantificar o número de pacientes atendidos no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço e no serviço de odontologia; Identificar os dados sócio demográficos; Avaliar os hábitos do paciente; Identificar o histopatológico e o sítio primário e Classificar o estágio do tumor. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo dos pacientes atendidos desde janeiro de 2009 a dezembro de 2013 dos pacientes atendidos nos Serviços de Cabeça e Pescoço e de Odontologia na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON. **Resultados:** Foram analisados 84 prontuários de pacientes no setor de arquivos médicos (SAME) da FCECON. O levantamento das neoplasias de câncer de boca estão distribuídas na tabela 1, que mostra o perfil sociodemográfico, com predomínio de acometimentos no gênero masculino (66,6%) com média de idade de 52 anos. Outra variável avaliada foi à naturalidade, constatamos que 63,1% são do Estado do Amazonas Observou-se que em relação ao estado civil 40,3% eram casados. Quando levantamos os hábitos dos pacientes, obteve-se 39,3% que eram tabagistas e etilistas e 19,04% eram tabagistas. A localização do tumor primário o mais acometido é a língua oral com (35,7%) seguido do assoalho da boca com 16,7% e o tipo histológico dos pacientes diagnosticados com neoplasia de cavidade oral no período do estudo o Carcinoma de célula escamosa é o mais predominante (71,4%). Os pacientes diagnosticados com câncer de boca na FCECON são diagnosticados tardiamente 69,2% são classificados em T3 e T4. **Conclusão:** O câncer de boca no Estado Amazonas é diagnosticado tardiamente e tem um predomínio nos homens. Os fatores de risco como o tabagismo e o etilismo estão presentes na maioria dos pacientes diagnosticados.

Palavras-chave: neoplasia; cavidade oral; epidemiologia

### REFERÊNCIAS

- Almeida, AF; Alves, RC; Felix, JD et al. Qualidade de Vida das Pessoas Acometidas por câncer no trato aerodigestivo superior em um Hospital Universitário. *Revista Brasileira de Cancerologia*, 2013; 59(2): 229-237
- Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativas 2014: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro; INCA; 2013.
- Oliveira, L.R; Silva, Alfredo Ribeiro; Zucoloto, S. Perfil da incidência e da sobrevida de pacientes com carcinoma epidermóide oral em uma população brasileira. *Jornal Brasileiro Patologia Medicina Laboratorial*, 2006. V.42. n.05. p 385-392