

## TUMOR DE BUSCHKE-LOWESTEIN EM GRÁVIDA: TRATAMENTO COM BEM SUCEDIDO COM IMIQUIMOD ISOLADAMENTE. RELATO DE CASO

Adalberto Caoru Haji Junior; Marcelo Henrique dos Santos; Rebeca Aparecida dos Santos di Tommaso; Paulo Roberto Mendonça dos Santos Junior; Ejandre Lunieres Santiago; Marco Antonio Ricci Correa Junior; Marcio Neves Stefani

**Introdução:** Em 1925, Abraham Buschke e Ludwig Löwenstein descreveu a doença e classificou-o como um condiloma acuminado potencialmente maligno<sup>1</sup>. A doença é caracterizada pelo desenvolvimento e progressão de tumores exofíticos, ulcerosos e em forma de couve-flor que se infiltram nos tecidos adjacentes<sup>2</sup>. Há diversas formas de tratamentos bem sucedidos relatados na literatura, incluindo as ressecções cirúrgicas<sup>3</sup>. **Objetivo:** relatar um caso de sucesso no tratamento do tumor de Buschke-lowestein em uma paciente grávida com imiquimod que obteve sucesso. **Métodos:** As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com a paciente e revisão da literatura. **Resultados:** paciente do sexo feminino, 20 anos, grávida de 19 semanas. Evoluindo há aproximadamente um ano com prurido em região genital. Há aproximadamente seis meses evoluindo com lesão verrucosa bilateral em vulva, de crescimento rápido, associada a dor leve e episódios de sangramento local, progredindo com crescimento até infiltração do canal anal. Realizada biópsia com diagnóstico de condiloma acuminado (lesão intraepitelial escamosa, papilomatosa de baixo grau). Paciente manifestou desejo de não interromper gravidez para tratamento cirúrgico, optando por terapia medicamentosa local com reavaliação da resposta clínica periódica. Evoluiu após o tratamento com imiquimod com regressão total da lesão. Após a gestação o recém-nascido foi concebido à termo, sem intercorrências e sem comorbidades. **Considerações finais:** a apresentação de tumorações condilomatosas gigantes requer, na maioria das vezes a combinação de terapias sistêmicas e locais para o devido tratamento. Pacientes com risco elevado para a cirurgia ou que apresentem contra-indicações podem ser avaliados quanto ao tratamento com terapias locais isoladas como o imiquimod, podendo vir a responder de forma bem sucedida.

### REFERÊNCIAS

1 - Buschke A. (1896). In Stereoscopischer medicinischer Atlas, edited by A. In: Neisser A, Cassel Fischer, Löwenstein L, editors. Dsch med Wschr. 1932. p. 58.2 - Spinu D, Radulescu A, Bratu o et al. Giant Condyloma Acuminatum —Buschke-Löwenstein Disease —a Literature Review. Chirurgia, 2014. 109 (4) 445-450. 3 —Gautam NG, Sheetal TY, Gole SG, Prabhala. Successful Treatment of Buschkeöwenstein Tumour by Surgical Excision Alone. J Cutan Aesthet Surg. 2010 Sep-Dec; 3(3): 174—.