

RELATO DE CASO DE SERINGOMA CONDROIDE EM GLÂNDULA LACRIMAL

Yure Augusto Souza Fonseca Oliveira⁽¹⁾; Alisson Fernando Almeida e Silva⁽¹⁾; Flávia Callou Tavares⁽¹⁾; Kenit Di Dio Aragão Minori⁽¹⁾; Matheus Torres Muniz⁽¹⁾; Thiago Torres Muniz⁽¹⁾; Yuri Ribeiro Carneiro⁽¹⁾; George Emilio Sobreira Carneiro⁽²⁾

(1): Acadêmico de Medicina da Universidade Nilton Lins (2): Medico Oftalmologista preceptor de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza Ceará

Introdução: Introdução: O Siringoma condroide é um tumor misto cutâneo, benigno e raro, com prevalência de aproximadamente 0,01% dos tumores de pele(1),(2). Esse tumor é tratado inicialmente por excisão cirúrgica e devido as suas características incomuns, o diagnóstico é realizado sempre por análise microscópica, podendo ser associado ou não a estudo imunoistoquímico(3). O caso em questão demonstra um caso raro de Siringoma condroide com envolvimento orbitário em região de glândula lacrimal. **Objetivo:** Apresentar caso de Siringoma Condroide, em região orbitaria e seu diagnostico diferencial com adenoma e adenocarcinoma de glândula lacrimal. **Metodologia:** Foi feito um estudo retrospectivo com análise do prontuário de paciente da CLINICA INTEGRADA DE OLHOS(CLIO) em Fortaleza no ano de 2017. Analisando sua queixa, seu exame físico, sua imunohistoquímica como o anatomopatológico para o diagnóstico e seu tratamento. Foi preservada a sua identidade. **Resultados:** SCP, masculino, 50 anos, procurou serviço de oftalmologia em Juazeiro do Norte/CE se queixando de desconforto em região ocular. É etilista social e ex-tabagista. Ao exame oftalmológico, apresentava acuidade visual com a melhor correção: 20/20 em ambos os olhos e proptose axial a direita e dolorimento local aos esforços. Foi solicitado TC de crânio onde foi evidenciado uma estrutura nodular adjacente a glândula lacrimal medindo 1,5x1,2x0cm do lado direito. Fazendo diagnostico diferencial pela imagem com adenoma pleomorfo e com adenocarcinoma. Com esse quadro, foi indicado cirurgia para exérese da lesão via traspalpebral e o resultado da patologia evidenciou Siringoma condroide. Nesse caso a cirurgia promoveu a retirada da lesão, preservando a glândula lacrimal por meio de uma incisão mínima traspalpebral e com cicatriz estética. **Considerações finais:** o Siringoma Condroide é uma lesão benigna e estando nessa região faz diagnostico diferencial com Adenoma pleomorfo e Adenocarcinoma de glândula lacrimal (primário ou metastático). O diagnostico histológico de Siringoma Condroide tranquiliza a equipe médica e o paciente devido ao seu melhor prognóstico, menor risco de malignização e pouca possibilidade de recidiva.

Descritores: Siringoma Condroide; Adenocarcinoma de Glândula Lacrimal; Relato de Caso

REFERÊNCIAS

- Bekerecioglu M, Tercan M, Karakok M, Atik B. Benign chondroid syringoma: a confusing clinical diagnosis. *Eur J Plast Surg.* 2002;25:316-318.
- Tokyol C, Aktepe F, Yavas BD, Yildiz H, Aycicek A. Chondroid syringoma: a casereport. *Acta Cytol.* 2010 Sep-Oct;54(5 Suppl):973-6.
- Agrawal A, Kumar A, Sinha AK, Kumar B, Sabira KC. Chondroid Syringoma. *Singapore Med J.*2008;49:33-34.